

看護学生向け 《選択問題》 【婦人科】

83. 卵巣と子宮の間を結ぶ靭帯はどれか

- a. 卵巣提索
- b. 卵巣固有靭帯
- c. 円靭帯
- d. 基靭帯
- e. 仙骨子宮靭帯

正解 b

84. 子宮から直接出ている靭帯でないのはどれか

- a. 卵巣提索
- b. 卵巣固有靭帯
- c. 円靭帯
- d. 基靭帯
- e. 仙骨子宮靭帯

正解 a

85. 膣前庭の後側方に開口する分泌腺で開口部が炎症によって閉鎖されると膿瘍や嚢胞などの病変が形成されるのはどれか

- a. スキーン腺
- b. バルトリン腺
- c. 皮脂腺
- d. 汗腺
- e. グラーフ腺

正解 b

86. 成熟女性の膣の自浄作用を主に司っているのはどれか

- a. デーデルライン杆菌
- b. 大腸菌
- c. 乳酸菌
- d. カンジダ
- e. B群溶連菌

正解 a

87. 子宮筋腫の治療法として適切でないのはどれか

- a. 単純子宮全摘術
- b. 広汎性子宮摘出術
- c. 子宮筋腫核出術
- d. 子宮動脈塞栓術
- e. GnRH アゴニスト療法

正解 b

88. 子宮内膜症の際に上昇する腫瘍マーカーはどれか

- a. CA125
- b. CA19-9
- c. SCC
- d. CEA
- e. LDH

正解 b

89. 避妊法で最も避妊成績が良いのはどれか

- a. 膣外射精
- b. コンドーム
- c. 殺精子薬
- d. 経口避妊薬
- e. オギノ式

正解 d

90. 絨毛がんの治療に最もよく用いられるのはどれか

- a. メソトレキセート
- b. シスプラチン
- c. パクリタキセル
- d. ブレオマイシン
- e. マイトマイシン C

正解 a

91. 腹腔鏡手術について正しいのはどれか

- a. 通常 1 箇所だけ腹壁に切開を加えて手術を行う
- b. 手術合併症は開腹手術よりも少ない
- c. 子宮内膜症の治療には用いない
- d. 気腹を行うことがある
- e. 局所麻酔で行う

正解 d

92. 子宮頸がんの原因はどれか

- a. クラミジア
- b. トリコモナス
- c. パルボウイルス
- d. ヘルペスウイルス
- e. パピローマウイルス

正解 e

93. 更年期障害の原因となるホルモンの低下はどれか

- a. プロゲステロン
- b. アンドロゲン
- c. エストロゲン
- d. プロラクチン
- e. オキシトシン

正解 c

94. 子宮頸癌検診を行う場合、最初に行う検査はどれか

- a. コルポスコピー
- b. 狙い組織診
- c. 細胞診
- d. MRI
- e. CT

正解 c

95. 婦人科診察の姿勢はどれか

- a. 仰臥位
- b. 腹臥位
- c. 半座位
- d. 砕石位
- e. 立位

正解 d

96. 子宮体癌のリスクとなるホルモンはどれか

- a. エストロゲン
- b. プロゲステロン
- c. プロラクチン
- d. オキシトシン
- e. インスリン

正解 a

97. 直腸診が特に重要な診察となる疾患はどれか・

- a. 子宮頸癌
- b. 子宮内膜ポリープ
- c. 子宮筋腫
- d. 卵管炎
- e. ヘルペス外陰炎

正解 a

98. 子宮頸癌の診断にとくに有効な検査はどれか。

- a. 子宮卵管造影検査
- b. ヒステロスコピー
- c. コルポスコピー
- d. 膣分泌物培養検査
- e. 尿沈査

正解 c

99. 子宮頸癌で手術療法と同程度に有効な治療法はどれか。

- a. 化学療法（抗がん剤）
- b. エストロゲン補充療法
- c. 温熱療法
- d. 子宮動脈塞栓術
- e. 放射線療法

正解 e

100. 子宮体癌の治療法はどれか。

- a. MPA 療法
- b. エストロゲン補充療法
- c. 免疫療法
- d. GnRH アゴニスト療法
- e. 低容量ピル

正解 a

101. 子宮筋腫について正しいのはどれか。

- a. 閉経後に大きくなる。
- b. 初経前に存在する。
- c. 40 歳代での頻度は 2%程度である。
- d. GnRH アゴニスト療法が有効である。
- e. 月経量が減少することが多い。

正解 d

102. 子宮内膜症の治療法はどれか

- a. 化学療法（抗がん剤）
- b. エストロゲン補充療法
- c. 温熱療法
- d. 子宮動脈塞栓術
- e. GnRH アゴニスト療法

正解 e

103. 閉経後女性について誤りはどれか

- a. 女性ホルモンが低値となる。
- b. ほてり・発汗などの症状が見られる。
- c. 性腺刺激ホルモンが低値となる。
- d. いらいらなどの症状が見られる。
- e. 萎縮性膣炎を呈する。

正解 c

104. 子宮内膜症について正しいのはどれか。

- a. 最近減少傾向にある。
- b. エストロゲン補充療法が有効である。
- c. 妊孕能には影響しない。
- d. 閉経後に頻度が増加する。
- e. 月経痛をきたすことが多い。

正解 e

105. 部分胞状奇胎の染色体数はどれか、

- a. 23 本
- b. 45 本
- c. 46 本
- d. 47 本
- e. 69 本

正解 e

看護学生向け 《選択問題》 【性感染症】

106. 女性に最も多い性感染症はどれか。

- a. 梅毒
- b. 淋菌感染症
- c. 性器ヘルペス
- d. 性器クラミジア
- e. 尖圭コンジローマ

正解：d

107. HPV（ヒトパピローマウイルス）感染について正しいのはどれか。

- a. 産道感染を起こすことはない。
- b. 尖圭コンジローマは再発しやすい。
- c. ワクチン接種で尖圭コンジローマを予防できない。
- d. 子宮体癌（子宮内膜癌）の原因として重要である。
- e. 一般女性が生涯に感染する割合は10%程度である。

正解：b

108. PID（pelvic inflammatory diseases）の感染リスクを低下させるのはどれか。

- a. 膣炎
- b. 膣洗浄
- c. 子宮内避妊具の使用
- d. 複数の性的パートナー
- e. コンドームによる避妊

正解：e

109. 分娩時に帝王切開術を選択する感染症はどれか。

- a. 梅毒
- b. B型肝炎
- c. 性器ヘルペス
- d. 尖圭コンジローマ
- e. クラミジア感染症

正解：c

110. 妊婦の HIV 感染について正しいのはどれか。

- a. 経膣分娩を選択する。
- b. 最近、減少傾向にある。
- c. 同性間感染が大部分である。
- d. 出生児に対する抗ウイルス薬投与を行う。
- e. 妊娠中は児への影響を考慮して抗ウイルス薬投与を中断する。

正解 d

111. クラミジア感染について誤っているのはどれか

- a. 不妊の原因となる
- b. 流早産の原因となる
- c. 肝周囲炎を引き起こすことがある
- d. 大部分が排尿時痛などの症状を起こす
- e. 妊婦健診において全例にスクリーニング検査を行う

正解 d

112. 性器ヘルペスについて正しいのはどれか

- a. ほとんど無症状である
- b. 細菌感染が原因である
- c. 最も頻度の多い性感染症である
- d. 分娩時に所見があれば帝王切開を行う
- e. 一度感染すると再び症状を起こすことはない

正解 d

113. 性感染症について正しいのはどれか。

- a. 外陰ヘルペスは無症状であることが多い。
- b. 性器クラミジアは排卵障害の原因となる。
- c. 女性で最も頻度が多いのは梅毒感染である。
- d. 女性は男性よりも骨盤腹膜炎を起こしにくい。
- e. 妊娠中でも HIV 感染に対する抗ウイルス療法を行う。

正解 e